


Previna as úlceras de pressão



Utiliza uma algália?

Beba água em abundância. Pelo menos 1.5 l diários.



Lave as mãos antes e depois de manipular a sonda.
Mantenha a sonda e a área em redor limpa, lavando-a com água e sabão.

Consulte o folheto específico.

	Nascimento	2 meses	4 meses	6 meses	12 meses	18 meses	5 anos	10 anos	25 anos	45 anos	65 anos	10/10 anos	
Hepatite B	VHB 1	VHB 2		VHB 3									
Haemophilus influenzae b		Hib 1	Hib 2	Hib 3		Hib 4							
Difteria, tétano, tosse convulsa		DTPa 1	DTPa 2	DTPa 3		DTPa 4	DTPa 5						
Poliomielite		VIP 1	VIP 2	VIP 3		VIP 4	VIP 5						
Streptococcus pneumoniae		Pn13 1	Pn13 2		Pn13 3								
Neisseria meningitidis B		Men B	Men B		Men B								
Neisseria meningitidis C					Men C								
Sarampo, Parotidite epidémica, Rubéola				VASPR 1		VASPR 2							
Vírus do Papiloma Humano*							HPV 1,2						
Tétano, difteria e tosse convulsa								Tdpa - grávidas					
Tétano e difteria									Td 6	Td 7	Td 8	Td 9	Td 10



Evite falar alto sempre que estiver em uma unidade de saúde



Segurança na



Prestação de Cuidados

Construir uma Cultura de Segurança.
Um Compromisso de utentes e profissionais

2022

Participe ativamente no seu tratamento




Confirme a sua identificação antes de qualquer procedimento



Cumpra as regras de etiqueta respiratória e higienização das mãos



Cubra o nariz e a boca com a parte interna do braço, ou lenço descartável, sempre que espirrar ou tossir



Lave ou desinfete as mãos com frequência




Utilize sempre a máscara de forma correta

Cumpra a Medicação



<https://www.bosconsulta.com>

Previna as quedas no domicílio



Consulte o folheto específico.