

## ❖ Cirurgia

Existem várias técnicas: mini incisões ou incisões maiores com excisão total das estruturas modificadas.

*Para esclarecimento de qualquer dúvida contate o seu Médico de Família*

## Guillaume Dupuytren (1777-1835),



Médico-cirurgião francês nascido em Pierre-Buffière e morto em Paris, famoso pelas suas pesquisas em Patologia Cirúrgica. Foi cirurgião-chefe do Hôte-Dieu e médico de Luís XVIII e Carlos X. No seu currículo figuram a primeira extirpação de uma mandíbula e de um colo de útero afectados por cancro, além de ligação da artéria subclávia, criação de ânus artificial, cirurgia da fístula lacrimal e a descrição e tratamento da contratura da mão, que se tornou conhecida como doença de Dupuytren.



**Deformação da mão**

**Doença  
Dupuytren**


**atitude...!?**



Torres Vedras  
2022

## ❖ O que é a Doença Dupuytren

Doença caracterizada pela contratura progressiva da estrutura profunda da palma da mão e dedos.



Um ou mais dedos contraem-se, isto é, ficam dobrados para dentro da palma da mão de uma forma progressiva e irreduzível.

Dupuytren's Contracture



Afecta mais os homens do que as mulheres e, normalmente após os 40 anos. Mais frequente na mão dominante.


Existe maior incidência em doentes epiléticos, alcoólicos, diabéticos.

Com o avançar da doença, a incapacidade de estender os dedos totalmente agrava-se, tornando difícil a execução das tarefas diárias.

## ❖ Sinais e sintomas

O primeiro sinal da doença é um nódulo na palma da mão, próximo ao dedo da aliança ou do dedo menor. Podem surgir pregas ou umbilicações.

O nódulo pode ser confundido com um calo e, normalmente, não apresenta



dor.

Com a evolução da doença, outros nódulos aparecem, tornam-se progressivamente mais salientes tendo

o aspecto de cordão, levando à contração dos tendões dos dedos.

## ❖ Diagnóstico e tratamento

Normalmente o exame físico é suficiente, pois a doença é bastante clara.

A progressão é imprevisível.

Se a contratura é leve e não evolui de modo a prejudicar seriamente a capacidade do indivíduo de realizar tarefas diárias, não é necessário



tratamento.

Quando o doente se encontra impossibilitado de colocar a palma da mão por completo sobre uma superfície

lisa, a deformidade deve ser corrigida por meio de procedimento cirúrgico.